


〔動物用医薬品〕〔指定・要指示〕〔使用基準〕

リンコマイシン系抗菌剤

リンコシン[®]水溶散

LINCOCIN[®] Soluble Powder

物産アニマルヘルスから
販売開始



【リンコマイシンの特長】

- タンパク質合成阻害作用により、主にグラム陽性菌、各種嫌気性菌、スピロヘータおよびマイコプラズマに強い抗菌力を有します。
- 組織や食細胞への移行性が優れています。

【リンコシン水溶散の特長】

- 本剤は、リンコマイシン塩酸塩水和物を主成分とする飲水添加剤です。
- 食欲の低下した豚に対しても、飲水による確実な治療ができます。
- 豚群単位での効率的な疾病管理が可能です。
- 利便性が高く省力化できます。
- 投与期間の調整が容易です。

Drug Information

(使用前に必ず添付文書を読み、注意事項を守って使用して下さい。)

〔動物用医薬品〕〔指定・要指示〕〔使用基準〕

リンコマイシン系抗菌剤

リンコシン®水溶散

LINCOCIN® Soluble Powder

®登録商標

【成分及び分量】

品名	リンコシン水溶散
有効成分	リンコマイシン塩酸塩水和物
含量	本品1g中400mg(力価)

【効能又は効果】

〔有効菌種〕

本剤感性のブラキシピラ ハイオディセンテリー
クロストリジウム パープリンゲンス

〔適応症〕

豚：豚赤痢

鶏：壊死性腸炎

【用法及び用量】

1日体重1kg当たりリンコマイシンとして下記の量を飲水に均一に混じて5日間経口投与する。

豚：10mg(力価)

鶏(産卵鶏を除く。):2mg(力価)

【使用上の注意】 添付文書抜粋、詳細は添付文書を参照して下さい。

(基本的事項)

守らなければならないこと

(一般的注意)

- (1)本剤は、要指示医薬品であるので獣医師等の処方箋・指示により使用すること。
- (2)本剤は、効能・効果において定められた適応症の治療にのみ使用すること。
- (3)本剤は、定められた用法・用量を厳守すること。なお、用法・用量に定められた期間以内の投与であってもそれを反復する投与は避けること。
- (4)本剤の使用に当たっては、治療上必要な最小限の期間の投与に止めること。
- (5)本剤は、「使用基準」の定めるところにより使用すること。

注 意：本剤は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の4の規定に基づき上記の用法及び用量を含めて使用者が遵守すべき基準が定められた動物用医薬品ですので、使用対象動物〔豚、鶏(産卵鶏を除く。)]について上記の用法及び用量並びに次の使用禁止期間を遵守して下さい。

豚：食用に供するために殺する前4日間

鶏(産卵鶏を除く。):食用に供するために殺する前3日間

(専門的事項)

1.重要な基本的注意

・本剤は、大腸菌に対しては抗菌力を持たないことから、大腸菌症発生のおそれがある場合は、別途、適切な薬剤を選択して使用すること。

2.副作用

・本剤の投与により、豚において、まれに一時的な軟便がみられるとの報告がある。

【包装】

80g、80g×6本

